

# Manejo de la Libreta Integral de Salud



# Manejo de la Libreta Integral de Salud

La Libreta Integral de Salud (LIS) permite unificar la información de las prestaciones que reciben las **gestantes, niños y niñas menores de 5 años** en un solo documento, facilitando el monitoreo de las atenciones y controles por parte del personal de salud, familias y cuidadores.

La LIS registra información de **mujeres gestantes** como: controles prenatales, vacunación, ganancia de peso, asistencia a sesiones de educativas.

A los niños y niñas se registran datos del recién nacido, controles de crecimiento y desarrollo, curvas de crecimiento, tamizaje, vacunación, entre otros..

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

La LIS debe ser entregada en la primera consulta de gestantes y niñas/niños menores de 5 años (que no dispongan de la LIS).

No reemplazar las LIS de niñas/os (menores de 5 años) de la versión anterior, salvo que estas se encuentren en mal estado o se hayan extraviado.

En caso de embarazos múltiples, se entregará una LIS para el control de la gestación y las LIS adicionales deben ser entregadas posterior al parto.

La programación de consultas o exámenes subsecuentes se lo realizará con lápiz.

Todos los ítems de la LIS deben procurar estar completos con la información indicada según corresponda

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Componentes

- Embarazada
- Niña/niño menor de 5 años de edad



## Usuarios/as

- Gestantes
- Madres/padres/familia/cuidadores de niñas/niños menores de 5 años.
- Personal de la salud del SNS que utiliza la LIS para atención de la gestante y de niñas/niños menores de 5 años.

La LIS es un **documento legal** de uso e información de la gestante, de la madre, padre, familiar o cuidador/es de él/la/los/las niña/s/niño/s menores de 5 años y del personal de la salud del SNS, quienes serán responsables de resguardar la información contenida en este documento.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Consideraciones Generales

Considerar que algunas secciones de la LIS deberán ser llenadas con la respuesta de la/el usuaria/o.

Los responsables del correcto llenado de la LIS es el personal de la salud

### Planificación del parto y transporte

a. ¿Quién me acompañará al establecimiento de salud para el parto o emergencia?

Maria Mara / José Uvilus / Pedro Martínez



b. ¿Quién cuidará mi casa, mis hijos y mis animales?

Josefina Vera



# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Consideraciones Generales

### Calendario de prestaciones de salud

#### Durante el embarazo

Este es un cuadro informativo. Asegúrese de recibir las prestaciones de salud según la semana

| Nro. | Prestación                       | Semana de gestación |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|----------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      |                                  | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1    | Captación en el primer trimestre | Primer control      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2    | Control prenatal*                |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3    | Consejería                       |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4    | Sesiones de educación prenatal   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5    | Ecos obstétricos<br>(al menos 2) |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |

Contiene apartados que son informativos en los cuales no se requiere realizar apuntes

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Consideraciones Generales

Puede requerir información de manera numérica o escrita

| Fecha de atención |     |      |
|-------------------|-----|------|
| Día               | Mes | Año  |
| 23                | 10  | 2023 |
|                   |     |      |

El formato para llenar fechas, se lo realizará en el orden de día, mes y año.

Algunos datos pueden requerir ser marcados en casilleros o círculos, mismos que pueden estar coloreados o no

HCU: 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

  
CC/CI: 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nombres: MARIA JOSÉ

Apellidos: MARTINEZ MERA

| ESTADO CIVIL   |                                  |            |                       | VIVE SOLA |                                  |
|----------------|----------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|
| Unión de hecho | <input type="radio"/>            | Divorciada | <input type="radio"/> | no        | <input checked="" type="radio"/> |
| Soltera        | <input checked="" type="radio"/> | Viuda      | <input type="radio"/> | si        | <input type="radio"/>            |
| Casada         | <input type="radio"/>            | Señora     | <input type="radio"/> |           |                                  |



# Manejo de la Libreta Integral de Salud

Al igual que la madre y el niño existe la sección de llenado de datos personales

## MUJER EMBARAZADA



Salud materna

HCU: 



  
 CCCL:

Nombres: .....  
 Apellidos: .....  
 Disponibilidad: SI ... No ... Tipo: .....  
 Teléfono domicilio: .....  
 Teléfono celular: .....  
 Dirección domicilio: .....  
 Zona: .....  
 Provincia: .....  
 Cantón: .....  
 Parroquia: .....  
 Problema de salud: .....

Ministerio de Salud Pública: ☐ Otro: ☐  
 Seguro de la Policía: ☐  
 Seguro de las Fuerzas Armadas: ☐  
 EBS: ☐  
 Seguro Social Campesino: ☐

## NIÑO/ NIÑA



Salud niño

HCU: 



  
 CCCL:

Nombres: .....  
 Apellidos: .....  
 Disponibilidad: SI ... No ... Tipo: .....  
 Fecha de nacimiento: 



 / 



 / 



  
 Teléfono domicilio: .....  
 Teléfono celular: .....  
 Dirección domicilio: .....  
 Nombre de la madre/padre: .....  
 Zona: .....  
 Provincia: .....  
 Cantón: .....  
 Parroquia: .....  
 Problema de salud: .....

Ministerio de Salud Pública: ☐ Otro: ☐  
 Seguro de la Policía: ☐  
 Seguro de las Fuerzas Armadas: ☐  
 EBS: ☐  
 Seguro Social Campesino: ☐

**Guíese por el código de color**

■ Salud infantil, crecimiento y desarrollo en niñas y niños menores de 5 años.  
■ Esquema de vacunación

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Componente Mujer Embarazada

### MUJER EMBARAZADA



■ Salud materna

IDENTIFICACION:

CC/DI:

Nombre:

Apellidos:

Discapacidad: SI ☐ No ☐ Tipo:

Teléfono domicilio:

Teléfono celular:

Dirección domiciliar:

Zona:

Provincia:

Canton:

Parroquia:

Establecimiento de salud:

Ministerio de Salud Pública: ☐

Seguro de la Policía: ☐ Otro:

Seguro de las Fuerzas Armadas: ☐

IESS: ☐

Seguro Social Campesino: ☐

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Calendario de Prestaciones de Salud

|      |                                          | Semana de gestación |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |    |         |    |         |    |    |    | Semana de edad postnatal |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------|----|---------|----|---------|----|----|----|--------------------------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nro. | Prestación                               | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13      | 14 | 15      | 16 | 17      | 18 | 19 | 20 | 21                       | 22 | 23 | 24 | 25      | 26 | 27 | 28 | 29      | 30 | 31 | 32 | 33      | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1    | Captación en el primer trimestre         | Primer control      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |    |         |    |         |    |    |    |                          |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2    | Control prenatal*                        |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Control |    | Control |    | Control |    |    |    | Control                  |    |    |    | Control |    |    |    | Control |    |    |    | Control |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3    | Consejería                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |    |         |    |         |    |    |    |                          |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4    | Secciones de educación prenatal          |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |    |         |    |         |    |    |    |                          |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5    | Exos obstruccion (al menos 3)            |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |    |         |    |         |    |    |    |                          |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6    | Prescripción de hierro más ácido fólico  |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |    |         |    |         |    |    |    |                          |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7    | Examen de proteinuria                    |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |    |         |    |         |    |    |    |                          |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8    | Examen de laboratorio TMO - ureolítico** |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |    |         |    |         |    |    |    |                          |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9    | Pruebas de TORCH***                      |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |    |         |    |         |    |    |    |                          |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10   | Valoración de hemoglobina                |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |    |         |    |         |    |    |    |                          |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11   | Vacuna dT****                            |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |    |         |    |         |    |    |    |                          |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12   | Tamizaje de VIH                          |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |    |         |    |         |    |    |    |                          |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13   | Examen VDRL (Sifilis)                    |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |         |    |         |    |         |    |    |    |                          |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Ideal un control prenatal mensual y mínimo 5 controles durante el embarazo (1.º en las primeras 20 semanas; 2.º entre las semanas 21-27; 3.º entre las semanas 28-33; 4.º entre las semanas 34-37; 5.º entre las semanas 38-40), o según prescripción del profesional en casos de riesgo materno neonatal.

\*\*Trimestral si hay historia de ITU recurrente y/o cuadro clínico de ITU.

\*\*\*Toxoplasmosis, rubéola citomegalovirus, herpes simple y VIH.

\*\*\*\*Evaluar antecedente vacunal. No aplicar más de 5 dosis. 1. dosis al contacto, 2. dosis al mes, 3. a los 6 meses, 4. al año y 5. al año.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Estrategia nacional para la eliminación de la transmisión materno - infantil del VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas (ETMI Plus)

| Periodo de embarazo | Tarjetaje                                | ***VIH | ***SÍFILIS | ***Hepatitis B | ****Enfermedad de Chagas |
|---------------------|------------------------------------------|--------|------------|----------------|--------------------------|
| Primer trimestre    | Fecha de realización                     |        |            |                |                          |
|                     | Resultado (para VIH/sífilis/hepatitis B) |        |            |                |                          |
|                     | Semana de gestación                      |        |            |                |                          |
| Segundo trimestre   | Fecha de realización                     |        |            |                |                          |
|                     | Resultado (para VIH/sífilis/hepatitis B) |        |            |                |                          |
|                     | Semana de gestación                      |        |            |                |                          |
| Tercer trimestre    | Fecha de realización                     |        |            |                |                          |
|                     | Resultado (para VIH/sífilis/hepatitis B) |        |            |                |                          |
|                     | Semana de gestación                      |        |            |                |                          |
| Parto               | Fecha de realización                     |        |            |                |                          |
|                     | Resultado (para VIH/sífilis/hepatitis B) |        |            |                |                          |
|                     | Semana de gestación                      |        |            |                |                          |
| Puerperio           | Fecha de realización                     |        |            |                |                          |
|                     | Resultado (para VIH/sífilis/hepatitis B) |        |            |                |                          |
|                     | Semana de gestación                      |        |            |                |                          |

\*Realizar un tarjetaje en cada trimestre del embarazo, en el momento del parto y uno en el puerperio.

\*\*Realizar un tarjetaje en la primera consulta del control prenatal, uno en el segundo trimestre, idealmente, antes de las 24 semanas y otro en el momento del parto o puerperio previo al alta.

\*\*\*Realizar un tarjetaje para hepatitis B en el primer trimestre, uno a la semana 20 de gestación y uno en el momento del parto.

\*\*\*\*Chagas en la primera consulta o incluso en el momento del parto, previamente analizando la historia de exposición de la paciente: reside en zona o área de riesgo de transmisión, madre con infección por tripanosomiasis, transfusiones de sangre y manifestaciones clínicas.

Aplicar consentimiento de información y confidencialidad de la información

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

|         |            | Fecha de atención |     |     | Fecha próxima consulta |     |     | Firma y sello del médico | Observaciones |
|---------|------------|-------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------------------|---------------|
|         |            | Día               | Mes | Año | Día                    | Mes | Año |                          |               |
| Control | Prenatales |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
|         |            |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
|         |            |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
|         |            |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
|         |            |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
|         |            |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
|         |            |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
|         |            |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
| Control | Puerpalo   |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
|         |            |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
|         |            |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
|         |            |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
|         |            |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
|         |            |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
|         |            |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |
|         |            |                   |     |     |                        |     |     |                          |               |

NOTA: En cada control debe registrarse la fecha de la próxima consulta.


| Tipo de vacuna                   | Dosis     | Fecha de aplicación |     |     | Edad de aplicación | Lote | Nombre y apellidos del vacunador | Nombre de la vacuna | Establecimiento de salud |
|----------------------------------|-----------|---------------------|-----|-----|--------------------|------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                  |           | Día                 | Mes | Año |                    |      |                                  |                     |                          |
| Toxoide diftérico tetánico (dT)* | 1.ª dosis |                     |     |     |                    |      |                                  |                     |                          |
|                                  | 2.ª dosis |                     |     |     |                    |      |                                  |                     |                          |
|                                  | 3.ª dosis |                     |     |     |                    |      |                                  |                     |                          |
|                                  | 4.ª dosis |                     |     |     |                    |      |                                  |                     |                          |
|                                  | 5.ª dosis |                     |     |     |                    |      |                                  |                     |                          |
| Tipo de vacunas                  | Dosis     | Fecha de aplicación |     |     | Edad de aplicación | Lote | Nombre y apellidos del vacunador | Nombre de la vacuna | Establecimiento de salud |
|                                  |           | Día                 | Mes | Año |                    |      |                                  |                     |                          |
|                                  |           |                     |     |     |                    |      |                                  |                     |                          |
|                                  |           |                     |     |     |                    |      |                                  |                     |                          |

\*La madre debe mencionar las dosis de vacunación de embarazos previos (llevar el carnet). Aplicar siempre y cuando no exista evidencia de vacunación anterior (pentavalente, DPT y dT) o completar esquema.

- Evaluar antecedente de vacunas.
- Primera dosis antes de las 20 semanas y la segunda dosis entre las semanas 27 y 29**
- Aplicar control subsecuente con la fecha de atención

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Curva de valoración del Índice de Masa Corporal (IMC) preconcepcional o del primer trimestre



**IMC < 18,5 Bajo peso:** ganancia de peso debe ser entre 12,5 a 18 kg

**IMC 18,5 – 24,9 Normo peso:** ganancia de peso debe ser entre 11,5 a 16 kg

**IMC 25 – 29 Sobrepeso:** ganancia de peso debe ser entre 7 a 11,5 kg

**IMC > 30 Obesidad:** ganancia de peso debe ser entre 5 a 9 kg


Índice de Masa Corporal

$$IMC = \frac{\text{Peso (Kg)}}{\text{Altura (m)}^2}$$

# Manejo de la Libreta Integral de Salud


Curva de ganancia de peso en la mujer embarazada

IMC preembarazo normal: 18.5 - 24.9




Curva de ganancia de peso en la mujer embarazada

IMC preembarazo bajo: < 18.5




Curva de ganancia de peso en la mujer embarazada

IMC preembarazo sobrepeso: 25.0 a 29.9



Curva de ganancia de peso en la mujer embarazada

IMC preembarazo obesidad: ≥ 30.0



# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Sección 7

### Recomendaciones para un embarazo saludable



Por su bienestar y el de su hijo o hija, acuda al primer control de salud apenas confirme su embarazo, de manera ideal antes de las 12 semanas (3 meses) y preferiblemente en compañía de su pareja o persona de su confianza.

Acuda al control prenatal una vez al mes o como se lo indique el profesional de la salud. Debe cumplir por lo menos con 5 controles durante su embarazo.

Durante su embarazo, le solicitarán varios exámenes clínicos para detectar posibles problemas que puedan afectar su salud y la de su hijo o hija. Recuerde hacerlos puntualmente.

Es su derecho recibir las prestaciones de salud detalladas en el calendario de las páginas 4 - 5 - 6.

No olvide realizarse las pruebas de VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas para prevenir problemas de salud en su hijo o hija.

**Recuerde:** Llevar siempre esta libreta de salud a todos sus controles prenatales y en el momento del parto. Cuidela y consérvela en un lugar seguro.

## Sección 8

### Alimentación saludable durante el embarazo



Arme un plato colorido con alimentos frescos y propios de la región.

**Consuma** todos los días alimentos como: huevo, pollo, res, cerdo, pescado, vísceras o similares. Puede reemplazarlos combinando un cereal con una leguminosa (granos) por ejemplo arroz con lenteja, tostado con chichos, etc.

**Preferir** vegetales de diferentes colores y fruta al natural en lugar de jugos.

**Alimentarse**, diariamente, con algún tipo de lácteo: leche pasteurizada, queso bajo en sal o yogur natural.

**Beba** agua hervida, aproximadamente 8 vasos al día. Evite gaseosas, bebidas azucaradas y alcohol.

**Evite** alimentos procesados (enlatados, empaquetados, conservas).

**Consuma** 5 comidas al día: 3 principales (desayuno, almuerzo, merienda) y 2 refrigerios (a media mañana y a media tarde).

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Sección 13 – Información Perinatal – FORM 051

### Formas de recolección de datos

En algunas secciones hay espacios libres que admiten la escritura de letras y números, como se ve en el ejemplo.

Dirección Domicilio:

Av. 5 de Junio y Gral. Miller

Otras secciones son de forma rectangular y solo admiten números.

Edad (años)

20

Correcto llenado



Cuando los datos registrados son marcados en el círculo amarillo, se considerará los mismos como un signo de alerta



Evitar otro tipo de llenado, por ejemplo:



## Sección 13 – Información Perinatal – FORM 051

Sección: Antecedentes familiares, personales y obstétricos

Sección: Gestación actual

Sección: Parto / Aborto

Sección: Morbilidad

Sección: Postparto

Sección: Morbilidad Materna Grave (NEAR MISS) Sección: Morbilidad Materna Grave (NEAR MISS)

Sección: Recién nacido

Sección: Egreso del recién nacido

Sección: Egreso materno

Sección: Anticoncepción

Sección: Detalles en Partograma

[illegible]

En caso de ABORTO se anota únicamente el Sexo, Malformaciones, Peso y Longitud al Nacer

Esta sección está destinada al registro de los controles del puerperio. Se anotará los tres primeros controles realizados cada 15 minutos, del total de 8 controles que recomienda la norma, los demás deberán anotarse en la hoja de evolución Formulario 005, durante las dos primeras horas después del parto.





# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Sección 13 – Información Perinatal – FORM 051 Reverso de la hoja

| CRITERIOS CLÍNICOS/DISFUNCIÓN ÓRGANO-SISTEMA |                                                       | VARIABLES IDENTIFICAR CASOS DE NEAR MISS |    | LABORATORIO                                |  | INTERVENCIONES |                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|--------------------------------------------|--|----------------|----------------------------------------------------------|
|                                              |                                                       | no                                       | si |                                            |  |                |                                                          |
| <b>Cardiovascular:</b>                       | <b>Renal:</b>                                         |                                          |    | <b>Laboratorio:</b>                        |  |                |                                                          |
| Shock                                        | Oliguria resistente a líquidos diuréticos             |                                          |    | Plaquetas < 50000/mm <sup>3</sup>          |  |                | Administración continua de agentes vasoactivos           |
| Peso cardíaco                                |                                                       |                                          |    | Creatinina > 300 micromoles/l > 3.5mg/dl   |  |                | Cuáles                                                   |
| Hepáticas:                                   | Hematólogicos/coagulantes:                            |                                          |    | Bilirrubina > 130 micromoles/l > 6.0 mg/dl |  |                | Intubación y ventilación no relacionada con la anestesia |
| Isquemia en pre-eclampsia                    | Alteraciones de la coagulación                        |                                          |    | pH < 7.1                                   |  |                | diagn                                                    |
| <b>Respiratorias:</b>                        | <b>Neurológicas:</b>                                  |                                          |    | Po2 < 90% > 1 hora                         |  |                | Administración > 3 vol. de hemoderivados                 |
| Diarrea aguda                                | Coma                                                  |                                          |    | Po2/FiO2 < 200 mmHg                        |  |                | Ingreso de UCI > 7 días                                  |
| Respiración jadeante (grunting)              | Inconsciencia prolongada > 12 hs                      |                                          |    | Lactato > 5 mmol/L > 45mg/dl               |  |                | Histadramina                                             |
| Taquipnea severa Ff > 40ppm                  | Accidente Cerebro Vascular                            |                                          |    |                                            |  |                | Dilatación en caso de IRA                                |
| Bradipnea severa FR < 6ppm                   | Convulsiones incontrolables/ estado de mal epiléptico |                                          |    |                                            |  |                | Reanimación cardio-pulmonar                              |
|                                              | Parálisis generalizada                                |                                          |    |                                            |  |                |                                                          |

Morbilidad grave es aquella que presenta una mujer que casi muere pero sobrevive a una complicación que ocurre durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de terminado el embarazo.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Sección 13 – Información Perinatal – FORM 051 Reverso de la hoja

|                                 |                               |                               |                                  |                                       |                                       |                                        |                                       |                                       |                                        |                                       |                                       |                                        |                            |                                                |                                         |                                    |                                         |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>RECÉN NACIDO</b>             |                               | <b>P. CEFÁLICO</b> cm         |                                  | <b>EDAD GESTACIONAL</b> semanas       |                                       | <b>PESO</b> K.G.                       |                                       | <b>APGAR</b> (min)                    |                                        | <b>REANIMACIÓN</b>                    |                                       | <b>FALLECE</b> en LASER de PARTO       |                            | <b>ATENCIÓN</b> (verificar con el médico)      |                                         | <b>Nombre</b>                      |                                         |
| <b>SEXO</b>                     | <b>PESO AL NACER</b>          | <b>LONGITUD</b> cm            | <b>ESTIMACIÓN</b>                | <b>1<sup>er</sup></b>                 | <b>5<sup>to</sup></b>                 | <b>12<sup>to</sup></b>                 | <b>1<sup>er</sup></b>                 | <b>5<sup>to</sup></b>                 | <b>12<sup>to</sup></b>                 | <b>1<sup>er</sup></b>                 | <b>5<sup>to</sup></b>                 | <b>12<sup>to</sup></b>                 | <b>PARO</b>                | <b>MEGATO</b>                                  | <b>Tipificación R.N.</b>                | <b>Visualiza K.</b>                | <b>Profilaxis Ocular</b>                |
| <input type="radio"/> masculino | <input type="radio"/> <2500 g | <input type="radio"/> >4000 g | <input type="radio"/> ESTIMACIÓN | <input type="radio"/> 1 <sup>er</sup> | <input type="radio"/> 5 <sup>to</sup> | <input type="radio"/> 12 <sup>to</sup> | <input type="radio"/> 1 <sup>er</sup> | <input type="radio"/> 5 <sup>to</sup> | <input type="radio"/> 12 <sup>to</sup> | <input type="radio"/> 1 <sup>er</sup> | <input type="radio"/> 5 <sup>to</sup> | <input type="radio"/> 12 <sup>to</sup> | <input type="radio"/> PARO | <input type="radio"/> MEGATO                   | <input type="radio"/> Tipificación R.N. | <input type="radio"/> Visualiza K. | <input type="radio"/> Profilaxis Ocular |
| <b>MÉTODO CANGURO</b>           |                               | <b>DEFECTOS CONGÉNITOS</b>    |                                  | <b>ENFERMEDADES</b>                   |                                       | <b>TAMIZAJE METABÓLICO</b>             |                                       | <b>TAMIZAJE AUDITIVO</b>              |                                        | <b>NACIMIENTOS PREMATUROS</b>         |                                       | <b>APROXIMACIÓN</b>                    |                            | <b>Resumen 1<sup>er</sup> a 3<sup>er</sup></b> |                                         |                                    |                                         |
| <input type="radio"/> SI        | <input type="radio"/> NO      | <input type="radio"/> SI      | <input type="radio"/> NO         | <input type="radio"/> SI              | <input type="radio"/> NO              | <input type="radio"/> SI               | <input type="radio"/> NO              | <input type="radio"/> SI              | <input type="radio"/> NO               | <input type="radio"/> SI              | <input type="radio"/> NO              | <input type="radio"/> SI               | <input type="radio"/> NO   | <input type="radio"/> SI                       | <input type="radio"/> NO                | <input type="radio"/> SI           | <input type="radio"/> NO                |
| <b>EGRESO RN</b>                |                               | <b>EGRESO MATERNO</b>         |                                  | <b>ANTICONCEPCIÓN</b>                 |                                       |                                        |                                       |                                       |                                        |                                       |                                       |                                        |                            |                                                |                                         |                                    |                                         |
| <input type="radio"/> Alta      | <input type="radio"/> Baja    | <input type="radio"/> Alta    | <input type="radio"/> Baja       | <input type="radio"/> SI              | <input type="radio"/> NO              | <input type="radio"/> SI               | <input type="radio"/> NO              | <input type="radio"/> SI              | <input type="radio"/> NO               | <input type="radio"/> SI              | <input type="radio"/> NO              | <input type="radio"/> SI               | <input type="radio"/> NO   | <input type="radio"/> SI                       | <input type="radio"/> NO                | <input type="radio"/> SI           | <input type="radio"/> NO                |
| <b>Fecha</b>                    |                               | <b>Fecha</b>                  |                                  | <b>Fecha</b>                          |                                       | <b>Fecha</b>                           |                                       | <b>Fecha</b>                          |                                        | <b>Fecha</b>                          |                                       | <b>Fecha</b>                           |                            | <b>Fecha</b>                                   |                                         | <b>Fecha</b>                       |                                         |
| <b>Certificado</b>              |                               | <b>Certificado</b>            |                                  | <b>Certificado</b>                    |                                       | <b>Certificado</b>                     |                                       | <b>Certificado</b>                    |                                        | <b>Certificado</b>                    |                                       | <b>Certificado</b>                     |                            | <b>Certificado</b>                             |                                         | <b>Certificado</b>                 |                                         |
| <b>Nombre</b>                   |                               | <b>Nombre</b>                 |                                  | <b>Nombre</b>                         |                                       | <b>Nombre</b>                          |                                       | <b>Nombre</b>                         |                                        | <b>Nombre</b>                         |                                       | <b>Nombre</b>                          |                            | <b>Nombre</b>                                  |                                         | <b>Nombre</b>                      |                                         |

MSPO/DEVALS/CHICS/SS/FORM 051/01 mayo/2018

Evidenciar las condiciones del recién nacido, el manejo adecuado en los primeros minutos de vida y las intervenciones implementadas de prevención, así como el tratamiento de las complicaciones.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Métodos anticonceptivos



### Pastillas anticonceptivas

Uso: Todas las mujeres en edad reproductiva. Se toma una tableta diaria durante 21 o 28 días, dependiendo de la presentación. Es importante tomarla a la misma hora todos los días.

Método elegido ☐ Método entregado ☐



### Inyecciones anticonceptivas

Uso: Todas las mujeres en edad reproductiva. Según el tipo de inyección se aplica mensual o trimestralmente.

Método elegido ☐ Método entregado ☐



### T de cobre

Uso: Todas las mujeres en edad reproductiva. Se coloca dentro de la cavidad uterina por personal calificado, puede durar de 5 a 10 años.

Método elegido ☐ Método entregado ☐

### Condón masculino y femenino

Es un método que brinda doble protección. Uso: Hombres y mujeres. A más de prevenir un embarazo, protege de infecciones de transmisión sexual.



Método elegido ☐ Método entregado ☐



### Implante subdérmico

Uso: Todas las mujeres en edad reproductiva. Se coloca bajo la piel del brazo una o dos tirillas que libera, permanentemente, una hormona por un periodo de 3 a 5 años.

Método elegido ☐ Método entregado ☐



### Ligadura de trompas

Uso: Mujeres en edad reproductiva que no desean tener más hijos e hijas. Método anticonceptivo definitivo. No afecta el deseo sexual. Procedimiento simple y seguro.

Método elegido ☐ Método entregado ☐



### Vasectomía

Uso: Hombres en edad reproductiva que no desean tener más hijos e hijas. Método anticonceptivo definitivo. No afecta el deseo sexual y es un procedimiento simple y seguro.

Método elegido ☐ Método entregado ☐



### Anticonceptivo oral de emergencia

Uso: Se toma de manera inmediata hasta los 5 días después de ocurrida la relación sexual sin protección o en caso de violación. Para prevenir embarazos no intencionados.

No es un método anticonceptivo regular.

Método elegido ☐ Método entregado ☐

Evidenciar las condiciones del recién nacido, el manejo adecuado en los primeros minutos de vida y las intervenciones implementadas de prevención, así como el tratamiento de las complicaciones.

No se requiere del consentimiento o aceptación de la pareja para la elección de cualquier método anticonceptivo incluyendo los quirúrgicos. Recuerde considerar las recomendaciones del profesional de salud sobre el uso de anticonceptivos durante los primeros seis meses al estar dando de lactar. Si requiere más información comuníquese a la línea gratuita y confidencial 171 opción 2.

Obtenga información y el método anticonceptivo más conveniente antes del alta del establecimiento de salud.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## SEGUNDO COMPONENTE

### Sección 1

#### NIÑO/ NIÑA



Guíese por el código de color

- Salud infantil, crecimiento y desarrollo en niñas y niños menores de 5 años.
- Esquema de vacunación.

RCU: 1 7 6 0 8 5 1 7 2 0

CCDC: 1 7 2 2 5 5 8 2 3 6

CCDC: 1 7 6 0 8 5 1 2 2 0

Nombre: Rosita Pichincha

Apellidos: Uvillas Martínez

Discapacidad: SI ☐ No ☒ Tipo ☐

Fecha de nacimiento:

08 05 2024  
Día Mes Año

Teléfono domicilio: 022497224

Teléfono celular: 0999981004

Dirección domicilio: Al Parvenir De 5 - 135 frente al UPC de Policía, casa de 2 pisos color rojo, portón café

Nombre de la madre/padre: Maria José Martínez Mera

José Uvillas

Zona: 2

Provincia: Pichincha

Cantón: Quito

Parroquia: Catacollao

Establecimiento de salud: Hospital Pablo Arturo Suárez

Ministerio de Salud Pública: ☒

Seguro de la Policía: ☐

Otro: ☐

Seguro de las Fuerzas Armadas: ☐

IESS: ☐

Seguro Social Campesino: ☐

NIÑO/ NIÑA

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Calendario de prestaciones de salud

Para niños y niñas hasta los 2 años de edad

Este es un cuadro informativo. Asegúrese que su niño o niña reciba las prestaciones de salud

| Nro. | Prestación                                       | Ejecutar                   | Meses |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      |                                                  |                            | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1    | Algo prenat                                      | En el parto                |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2    | Primer control y evaluación de condición inicial | En el parto                |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3    | Control de lactancia                             | En el parto                |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4    | Tratamiento dental                               | 4-6 días                   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5    | Tratamiento dental                               | Según orden del odontólogo |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6    | Control de crecimiento                           | Según orden del odontólogo |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7    | Seguimiento de crecimiento y desarrollo motor    | Según orden del odontólogo |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8    | Seguimiento de desarrollo intelectual y lenguaje | Según orden del odontólogo |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9    | Seguimiento de desarrollo emocional y social     | Según orden del odontólogo |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10   | Seguimiento de desarrollo físico                 | Según orden del odontólogo |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11   | Seguimiento de desarrollo intelectual y lenguaje | Según orden del odontólogo |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Evidenciar las condiciones del recién nacido, el manejo adecuado en los primeros minutos de vida y las intervenciones implementadas de prevención, así como el tratamiento de las complicaciones.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Sección 2

### Salud infantil

Para poder completar esta información por su hijo(a) en la libreta, los controles de los niños y niñas deben ser dirigidos por un profesional de la salud.

|                   |  |                         |  |             |  |                    |  |                    |  |
|-------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| <b>RECIBIENDO</b> |  | <b>EDAD GESTACIONAL</b> |  | <b>PESO</b> |  | <b>APGAR (min)</b> |  | <b>REANIMACIÓN</b> |  |
| PESO AL NACER     |  | A. EMBARAZO             |  | PESO        |  | 1 <sup>ra</sup>    |  | no al              |  |
| LONGITUD AL NACER |  | B. PARTO                |  | PESO        |  | 2 <sup>da</sup>    |  | no al              |  |
| C. ESTIMACIÓN     |  | D. PARTO                |  | PESO        |  | 3 <sup>ra</sup>    |  | no al              |  |
| E. PARTO          |  | F. PARTO                |  | PESO        |  | 4 <sup>ta</sup>    |  | no al              |  |
| G. PARTO          |  | H. PARTO                |  | PESO        |  | 5 <sup>ta</sup>    |  | no al              |  |
| I. PARTO          |  | J. PARTO                |  | PESO        |  | 6 <sup>ta</sup>    |  | no al              |  |
| K. PARTO          |  | L. PARTO                |  | PESO        |  | 7 <sup>ta</sup>    |  | no al              |  |
| M. PARTO          |  | N. PARTO                |  | PESO        |  | 8 <sup>ta</sup>    |  | no al              |  |
| O. PARTO          |  | P. PARTO                |  | PESO        |  | 9 <sup>ta</sup>    |  | no al              |  |
| Q. PARTO          |  | R. PARTO                |  | PESO        |  | 10 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| S. PARTO          |  | T. PARTO                |  | PESO        |  | 11 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| U. PARTO          |  | V. PARTO                |  | PESO        |  | 12 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| W. PARTO          |  | X. PARTO                |  | PESO        |  | 13 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| Y. PARTO          |  | Z. PARTO                |  | PESO        |  | 14 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| AA. PARTO         |  | AB. PARTO               |  | PESO        |  | 15 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| AC. PARTO         |  | AD. PARTO               |  | PESO        |  | 16 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| AE. PARTO         |  | AF. PARTO               |  | PESO        |  | 17 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| AG. PARTO         |  | AH. PARTO               |  | PESO        |  | 18 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| AI. PARTO         |  | AJ. PARTO               |  | PESO        |  | 19 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| AK. PARTO         |  | AL. PARTO               |  | PESO        |  | 20 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| AM. PARTO         |  | AN. PARTO               |  | PESO        |  | 21 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| AO. PARTO         |  | AP. PARTO               |  | PESO        |  | 22 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| AQ. PARTO         |  | AR. PARTO               |  | PESO        |  | 23 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| AS. PARTO         |  | AT. PARTO               |  | PESO        |  | 24 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| AU. PARTO         |  | AV. PARTO               |  | PESO        |  | 25 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| AW. PARTO         |  | AX. PARTO               |  | PESO        |  | 26 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| AY. PARTO         |  | AZ. PARTO               |  | PESO        |  | 27 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| BA. PARTO         |  | BB. PARTO               |  | PESO        |  | 28 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| BC. PARTO         |  | BD. PARTO               |  | PESO        |  | 29 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| BE. PARTO         |  | BF. PARTO               |  | PESO        |  | 30 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| BG. PARTO         |  | BH. PARTO               |  | PESO        |  | 31 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| BI. PARTO         |  | BJ. PARTO               |  | PESO        |  | 32 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| BK. PARTO         |  | BL. PARTO               |  | PESO        |  | 33 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| BM. PARTO         |  | BN. PARTO               |  | PESO        |  | 34 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| BO. PARTO         |  | BP. PARTO               |  | PESO        |  | 35 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| BQ. PARTO         |  | BR. PARTO               |  | PESO        |  | 36 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| BS. PARTO         |  | BT. PARTO               |  | PESO        |  | 37 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| BU. PARTO         |  | BV. PARTO               |  | PESO        |  | 38 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| BW. PARTO         |  | BX. PARTO               |  | PESO        |  | 39 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| BY. PARTO         |  | BZ. PARTO               |  | PESO        |  | 40 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CA. PARTO         |  | CB. PARTO               |  | PESO        |  | 41 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CC. PARTO         |  | CD. PARTO               |  | PESO        |  | 42 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CE. PARTO         |  | CF. PARTO               |  | PESO        |  | 43 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CG. PARTO         |  | CH. PARTO               |  | PESO        |  | 44 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CI. PARTO         |  | CJ. PARTO               |  | PESO        |  | 45 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CK. PARTO         |  | CL. PARTO               |  | PESO        |  | 46 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CM. PARTO         |  | CN. PARTO               |  | PESO        |  | 47 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CO. PARTO         |  | CP. PARTO               |  | PESO        |  | 48 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CQ. PARTO         |  | CR. PARTO               |  | PESO        |  | 49 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CS. PARTO         |  | CT. PARTO               |  | PESO        |  | 50 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CU. PARTO         |  | CV. PARTO               |  | PESO        |  | 51 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CV. PARTO         |  | CW. PARTO               |  | PESO        |  | 52 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CX. PARTO         |  | CX. PARTO               |  | PESO        |  | 53 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CY. PARTO         |  | CY. PARTO               |  | PESO        |  | 54 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| CZ. PARTO         |  | CZ. PARTO               |  | PESO        |  | 55 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DA. PARTO         |  | DA. PARTO               |  | PESO        |  | 56 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DB. PARTO         |  | DB. PARTO               |  | PESO        |  | 57 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DC. PARTO         |  | DC. PARTO               |  | PESO        |  | 58 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DD. PARTO         |  | DD. PARTO               |  | PESO        |  | 59 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DE. PARTO         |  | DE. PARTO               |  | PESO        |  | 60 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DF. PARTO         |  | DF. PARTO               |  | PESO        |  | 61 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DG. PARTO         |  | DG. PARTO               |  | PESO        |  | 62 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DH. PARTO         |  | DH. PARTO               |  | PESO        |  | 63 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DI. PARTO         |  | DI. PARTO               |  | PESO        |  | 64 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DJ. PARTO         |  | DJ. PARTO               |  | PESO        |  | 65 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DK. PARTO         |  | DK. PARTO               |  | PESO        |  | 66 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DL. PARTO         |  | DL. PARTO               |  | PESO        |  | 67 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DM. PARTO         |  | DM. PARTO               |  | PESO        |  | 68 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DN. PARTO         |  | DN. PARTO               |  | PESO        |  | 69 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DO. PARTO         |  | DO. PARTO               |  | PESO        |  | 70 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DP. PARTO         |  | DP. PARTO               |  | PESO        |  | 71 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DQ. PARTO         |  | DQ. PARTO               |  | PESO        |  | 72 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DR. PARTO         |  | DR. PARTO               |  | PESO        |  | 73 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DS. PARTO         |  | DS. PARTO               |  | PESO        |  | 74 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DT. PARTO         |  | DT. PARTO               |  | PESO        |  | 75 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DU. PARTO         |  | DU. PARTO               |  | PESO        |  | 76 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DV. PARTO         |  | DV. PARTO               |  | PESO        |  | 77 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DW. PARTO         |  | DW. PARTO               |  | PESO        |  | 78 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DX. PARTO         |  | DX. PARTO               |  | PESO        |  | 79 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DY. PARTO         |  | DY. PARTO               |  | PESO        |  | 80 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| DZ. PARTO         |  | DZ. PARTO               |  | PESO        |  | 81 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EA. PARTO         |  | EA. PARTO               |  | PESO        |  | 82 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EB. PARTO         |  | EB. PARTO               |  | PESO        |  | 83 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EC. PARTO         |  | EC. PARTO               |  | PESO        |  | 84 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| ED. PARTO         |  | ED. PARTO               |  | PESO        |  | 85 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EE. PARTO         |  | EE. PARTO               |  | PESO        |  | 86 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EF. PARTO         |  | EF. PARTO               |  | PESO        |  | 87 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EG. PARTO         |  | EG. PARTO               |  | PESO        |  | 88 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EH. PARTO         |  | EH. PARTO               |  | PESO        |  | 89 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EI. PARTO         |  | EI. PARTO               |  | PESO        |  | 90 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EJ. PARTO         |  | EJ. PARTO               |  | PESO        |  | 91 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EK. PARTO         |  | EK. PARTO               |  | PESO        |  | 92 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EL. PARTO         |  | EL. PARTO               |  | PESO        |  | 93 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EM. PARTO         |  | EM. PARTO               |  | PESO        |  | 94 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EN. PARTO         |  | EN. PARTO               |  | PESO        |  | 95 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EO. PARTO         |  | EO. PARTO               |  | PESO        |  | 96 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EP. PARTO         |  | EP. PARTO               |  | PESO        |  | 97 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| EQ. PARTO         |  | EQ. PARTO               |  | PESO        |  | 98 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| ER. PARTO         |  | ER. PARTO               |  | PESO        |  | 99 <sup>ta</sup>   |  | no al              |  |
| ES. PARTO         |  | ES. PARTO               |  | PESO        |  | 100 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| ET. PARTO         |  | ET. PARTO               |  | PESO        |  | 101 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| EU. PARTO         |  | EU. PARTO               |  | PESO        |  | 102 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| EV. PARTO         |  | EV. PARTO               |  | PESO        |  | 103 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| EW. PARTO         |  | EW. PARTO               |  | PESO        |  | 104 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| EX. PARTO         |  | EX. PARTO               |  | PESO        |  | 105 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| EY. PARTO         |  | EY. PARTO               |  | PESO        |  | 106 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| EZ. PARTO         |  | EZ. PARTO               |  | PESO        |  | 107 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FA. PARTO         |  | FA. PARTO               |  | PESO        |  | 108 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FB. PARTO         |  | FB. PARTO               |  | PESO        |  | 109 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FC. PARTO         |  | FC. PARTO               |  | PESO        |  | 110 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FD. PARTO         |  | FD. PARTO               |  | PESO        |  | 111 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FE. PARTO         |  | FE. PARTO               |  | PESO        |  | 112 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FF. PARTO         |  | FF. PARTO               |  | PESO        |  | 113 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FG. PARTO         |  | FG. PARTO               |  | PESO        |  | 114 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FH. PARTO         |  | FH. PARTO               |  | PESO        |  | 115 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FI. PARTO         |  | FI. PARTO               |  | PESO        |  | 116 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FJ. PARTO         |  | FJ. PARTO               |  | PESO        |  | 117 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FK. PARTO         |  | FK. PARTO               |  | PESO        |  | 118 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FL. PARTO         |  | FL. PARTO               |  | PESO        |  | 119 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FM. PARTO         |  | FM. PARTO               |  | PESO        |  | 120 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FN. PARTO         |  | FN. PARTO               |  | PESO        |  | 121 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FO. PARTO         |  | FO. PARTO               |  | PESO        |  | 122 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FP. PARTO         |  | FP. PARTO               |  | PESO        |  | 123 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FQ. PARTO         |  | FQ. PARTO               |  | PESO        |  | 124 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FR. PARTO         |  | FR. PARTO               |  | PESO        |  | 125 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FS. PARTO         |  | FS. PARTO               |  | PESO        |  | 126 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FT. PARTO         |  | FT. PARTO               |  | PESO        |  | 127 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FU. PARTO         |  | FU. PARTO               |  | PESO        |  | 128 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FV. PARTO         |  | FV. PARTO               |  | PESO        |  | 129 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FW. PARTO         |  | FW. PARTO               |  | PESO        |  | 130 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FX. PARTO         |  | FX. PARTO               |  | PESO        |  | 131 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FY. PARTO         |  | FY. PARTO               |  | PESO        |  | 132 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| FZ. PARTO         |  | FZ. PARTO               |  | PESO        |  | 133 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GA. PARTO         |  | GA. PARTO               |  | PESO        |  | 134 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GB. PARTO         |  | GB. PARTO               |  | PESO        |  | 135 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GC. PARTO         |  | GC. PARTO               |  | PESO        |  | 136 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GD. PARTO         |  | GD. PARTO               |  | PESO        |  | 137 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GE. PARTO         |  | GE. PARTO               |  | PESO        |  | 138 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GF. PARTO         |  | GF. PARTO               |  | PESO        |  | 139 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GG. PARTO         |  | GG. PARTO               |  | PESO        |  | 140 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GH. PARTO         |  | GH. PARTO               |  | PESO        |  | 141 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GI. PARTO         |  | GI. PARTO               |  | PESO        |  | 142 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GJ. PARTO         |  | GJ. PARTO               |  | PESO        |  | 143 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GK. PARTO         |  | GK. PARTO               |  | PESO        |  | 144 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GL. PARTO         |  | GL. PARTO               |  | PESO        |  | 145 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GM. PARTO         |  | GM. PARTO               |  | PESO        |  | 146 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GN. PARTO         |  | GN. PARTO               |  | PESO        |  | 147 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GO. PARTO         |  | GO. PARTO               |  | PESO        |  | 148 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GP. PARTO         |  | GP. PARTO               |  | PESO        |  | 149 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GQ. PARTO         |  | GQ. PARTO               |  | PESO        |  | 150 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GR. PARTO         |  | GR. PARTO               |  | PESO        |  | 151 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GS. PARTO         |  | GS. PARTO               |  | PESO        |  | 152 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GT. PARTO         |  | GT. PARTO               |  | PESO        |  | 153 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GU. PARTO         |  | GU. PARTO               |  | PESO        |  | 154 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GV. PARTO         |  | GV. PARTO               |  | PESO        |  | 155 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GW. PARTO         |  | GW. PARTO               |  | PESO        |  | 156 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GX. PARTO         |  | GX. PARTO               |  | PESO        |  | 157 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GY. PARTO         |  | GY. PARTO               |  | PESO        |  | 158 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| GZ. PARTO         |  | GZ. PARTO               |  | PESO        |  | 159 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| HA. PARTO         |  | HA. PARTO               |  | PESO        |  | 160 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| HB. PARTO         |  | HB. PARTO               |  | PESO        |  | 161 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| HC. PARTO         |  | HC. PARTO               |  | PESO        |  | 162 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| HD. PARTO         |  | HD. PARTO               |  | PESO        |  | 163 <sup>ta</sup>  |  | no al              |  |
| HE. PARTO         |  | HE. PARTO               |  | PESO        |  | 164 <sup>ta</sup>  |  |                    |  |

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Sección 4

### Esquema de vacunación

Para niños y niñas menores de 2 años

Este es un cuadro informativo. Asegúrese de que su niño o niña reciba las vacunas oportunamente.

| Nro. | Prestación                                 | Meses                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      |                                            | 0 a 29 días                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1    | BCC (meningitis)                           | Dosis única<br>Primeras 24 horas |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2    | UII (hepatitis B II)                       | Dosis única<br>Primeras 24 horas |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3    | Neumococo (neumonía, meningitis, otitis)   | 1ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|      |                                            | 2ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|      |                                            | 3ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4    | Rotavirus                                  | 1ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|      |                                            | 2ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|      |                                            | 3ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5    | Vacuna tIPV (Poliomielitis)                | 1ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|      |                                            | 2ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|      | Vacuna tOPV (Poliomielitis)                | 3ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|      |                                            | 4ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6    | Paratuberculosis**                         | 1ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|      |                                            | 2ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|      |                                            | 3ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7    | DPT (Difteria, tétanos, tosferina)         | 4ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|      |                                            | 5ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8    | Vacuna SRP (sarampión, rubéola, paperella) | 1ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|      |                                            | 2ª dosis                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9    | Fiebre amarilla                            | Dosis única                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10   | Varicela                                   | Dosis única                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11   | Influenza estacional pediátrica            | 1ª y 2ª dosis                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12   | Influenza estacional pediátrica*           | 1 dosis                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Color verde para la vacuna

Óptimo (tiempo ideal)

Óptimo (tiempo aceptable)

Fuera de tiempo: aplicar

\* A partir de 1 año de edad se aplica una dosis anual.

\*\* Difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, meningitis y neumonía.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Sección 5

### Calendario de prestaciones de salud

Para niños y niñas de 2 a 5 años

Para ser un usuario informado, asegúrese de que a su niño o niña reciba las prestaciones:

|      |                                      | Meses                                                                         |               |                    |               |                       |               |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Sexo | Evidencia                            | 1 a 3 años                                                                    |               | 3 a 4 años         |               | 4 a 5 años            |               |
|      |                                      | 24 a 30 meses                                                                 | 31 a 36 meses | 36 a 48 meses      | 48 a 60 meses | 60 a 72 meses         | 72 a 84 meses |
| 1    | Control de crecimiento               | 24 meses                                                                      | 36 meses      | 36 meses           | 48 meses      | 48 meses              | 54 y 60 meses |
| 2    | Recibido la vacuna de adeno-papiloma | 1 dosis                                                                       |               | 1 dosis            |               | 2da dosis de refuerzo |               |
| 3    | Control de anemia                    | 30 días de salud y presencia de anemia o niveles de Hb. por debajo de 10 g/dl |               |                    |               |                       |               |
| 4    | Control de vista                     |                                                                               |               | 36 meses           |               | 48 meses              | 60 meses      |
| 5    | Control de oído y habla              |                                                                               |               | 1 vez cada 6 meses |               |                       |               |
| 6    | Actualización de hemograma           | 24 meses                                                                      | 36 meses      | 36 meses           | 48 meses      | 48 meses              | 54 y 60 meses |
| 7    | Control de función de tiroides T4    | 24 meses                                                                      | 36 meses      | 36 meses           | 48 meses      | 48 meses              | 54 y 60 meses |

## Sección 6

### NOTAS

Para uso exclusivo de la madre y/o cuidador de la niña o niño

Inicio gateo a los 8 meses

Empezo a caminar a los 12 meses






# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Sección 7 – Curva de crecimiento: peso, longitud, IMC y perímetro cefálico para la edad niñas y niños

Peso para la edad en niñas  
Desde el nacimiento hasta los 5 años

Perímetro cefálico para la edad en niñas  
Desde el nacimiento hasta los 2 años



## Sección 7 – Curva de crecimiento: peso, longitud, IMC y perímetro cefálico para la edad niñas y niños

**Longitud:** Mide el tamaño de niños desde la coronilla de la cabeza hasta los pies (talones) y se mide acostado, boca arriba (en cúbito supino). Esta medida se toma en niños de **cero a veinticuatro meses**.

**Talla:** Mide el tamaño del individuo desde la coronilla de la cabeza hasta los pies (talones); en posición vertical (parado). La talla se toma en niños mayores a veinticuatro meses. En general, la talla es menor que la longitud en alrededor de 0,7 cm.

**Perímetro cefálico:** Desde el nacimiento hasta los 2 años se grafica.

## De 0 a 11 meses de edad

[illegible]

Los primeros ocho meses se evalúe una vez por mes; de ocho a 12 meses cada dos meses y desde del primer año al segundo año trimestralmente.

En recién nacidos sin riesgo el **primer control** se realizará entre el **tercer a quinto día** de vida o 48 a 72 horas después del alta del recién nacido, para detectar rápidamente problemas de lactancia e ictericia.

## Sección 8

### Suplementación con Vitamina A

VITAMINA A. ESQUEMA UNIVERSAL (Preventivo)

| Esquema                  | Vitamina A - MEGADOSIS | Presentación |       |
|--------------------------|------------------------|--------------|-------|
|                          |                        | ml.          | Gotas |
| 2 meses a < 6 meses *    | 50.000 UI              | 0,3          | 6     |
| 6 meses a < 11 meses **  | 100.000 UI             | 0,6          | 12    |
| 12 meses a < 59 meses ** | 200.000 UI             | 1,2          | 24    |

\*Dosis única a menores de 6 meses no lactantes, que no hayan recibido lactancia materna ni sucedáneos de la leche materna enriquecidos con vitamina A

A partir de los 6 meses iniciar el esquema preventivo según edad del niño cada 6 meses hasta los 59 meses de edad.

\*\* Cada 6 meses.

- La mortalidad en niños y niñas reduce de un 19 a 23%, por sarampión y diarrea.
- Disminuye la incidencia, prevalencia y severidad de diarrea.
- Disminuye complicaciones graves de sarampión
- Mejora la respuesta inmune
- Reduce le tiempo de hospitalización en enfermedades.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Tamizaje e hitos del desarrollo

De 0 a 11 meses de edad

### Tamizaje metabólico

| Fecha de nacimiento |     |     | Edad | Resultado (Normal) |    | Patología |
|---------------------|-----|-----|------|--------------------|----|-----------|
| Día                 | Mes | Año |      | SI                 | No |           |
|                     |     |     |      |                    |    |           |
|                     |     |     |      |                    |    |           |
|                     |     |     |      |                    |    |           |
|                     |     |     |      |                    |    |           |
|                     |     |     |      |                    |    |           |
|                     |     |     |      |                    |    |           |
|                     |     |     |      |                    |    |           |
|                     |     |     |      |                    |    |           |
|                     |     |     |      |                    |    |           |

Ver en el anexo 1 y 2 del manual de procedimientos

### Neurodesarrollo - Test Denver II \*

| Fecha de atención |     |     | Edad | Resultado |         |          |
|-------------------|-----|-----|------|-----------|---------|----------|
| Día               | Mes | Año |      | Normal    | Atípico | Refracta |
|                   |     |     |      |           |         |          |
|                   |     |     |      |           |         |          |
|                   |     |     |      |           |         |          |
|                   |     |     |      |           |         |          |
|                   |     |     |      |           |         |          |
|                   |     |     |      |           |         |          |
|                   |     |     |      |           |         |          |
|                   |     |     |      |           |         |          |
|                   |     |     |      |           |         |          |

\*Ver en el anexo 3 del manual de procedimientos (página 54 del anexo)

### Tamizaje auditivo

| Fecha de atención |     |     | Edad | Pasa |    | No Pasa |    | Referido |    |
|-------------------|-----|-----|------|------|----|---------|----|----------|----|
| Día               | Mes | Año |      | OD   | ID | OD      | ID | SI       | No |
|                   |     |     |      |      |    |         |    |          |    |
|                   |     |     |      |      |    |         |    |          |    |
|                   |     |     |      |      |    |         |    |          |    |
|                   |     |     |      |      |    |         |    |          |    |
|                   |     |     |      |      |    |         |    |          |    |
|                   |     |     |      |      |    |         |    |          |    |
|                   |     |     |      |      |    |         |    |          |    |
|                   |     |     |      |      |    |         |    |          |    |
|                   |     |     |      |      |    |         |    |          |    |

### Hitos del desarrollo

|                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Señala o muestra de 1 a 3 meses de edad</p> <p>SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/></p>  |  | <p>Maneja un dedo en lenguaje corporal con la madre o cuidador</p> <p>SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/></p> |
| <p>Señala o muestra de 4 a 11 meses de edad</p> <p>SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/></p> |  | <p>Realiza intercambio de manos</p> <p>SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/></p>                                |
| <p>Hace pinceto a los 18 meses de edad</p> <p>SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/></p>      |  | <p>Califica en sus primeros pasos de 18 a 22 meses de edad</p> <p>SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/></p>     |

\*Ver en el anexo 4 del manual de procedimientos (página 55 del anexo)

Evalúa el desarrollo psicomotriz y los aspectos que involucran en la coordinación en la movilidad y cuerpo en general, valora cuatro dimensiones a) Motricidad gruesa; b) Motricidad Fina; c) Lenguaje; d) Social - **Se recomienda una valoración mensual hasta los 2 años (mínimo una cada 3 meses).**

**Tamizaje auditivo:** Se ha demostrado que, al aplicarse universalmente este tamizaje a neonatos, disminuye la edad de detección de la hipoacusia mejorando el pronóstico. **Esta prueba se aplicará a los niños o niñas hasta los 5 años**

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Sección 10 Control del crecimiento y desarrollo del niño o la niña de 12 a 59 meses (1 a 5 años)

### Control de crecimiento y desarrollo del niño o la niña

De 12 a 23 meses de edad (1 a 2 años)

| Fecha de observación |     |     | Edad (meses) | Peso (kg) | Longitud (cm) | Participación en actividades (seg) | Alimentación      |                 | Suplementación  |                | Forma y salud |
|----------------------|-----|-----|--------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Día                  | Mes | Año |              |           |               |                                    | Lactancia materna | Otros alimentos | Otros alimentos | ***Vitaminas A |               |
|                      |     |     |              |           |               |                                    | SI                | NO              | SI              | NO             |               |
|                      |     |     |              |           |               |                                    |                   |                 |                 |                |               |
|                      |     |     |              |           |               |                                    |                   |                 |                 |                |               |
|                      |     |     |              |           |               |                                    |                   |                 |                 |                |               |
|                      |     |     |              |           |               |                                    |                   |                 |                 |                |               |
|                      |     |     |              |           |               |                                    |                   |                 |                 |                |               |

\* Clasificación de estado de nutrición: acorde a forma o sumatoria de puntuaciones obtenidas de varios grupos (delgados, malos, normales, buenos, sobrepeso, obesidad, etc.).

\*\* La normalidad de suplementación con hierro en países latinos que el riesgo de edad para la anemia de 6 a 23 meses (ver sobre suplementación de hierro, ver tabla de suplementación de hierro).

\*\*\* La suplementación con vitamina A debe ser supervisada por el médico. El suplemento de hierro (DHA) debe ser de 5 mg.

### Neurodesarrollo - Test Denver II

| Fecha de observación |     |     | Edad | Resultado |        |         |
|----------------------|-----|-----|------|-----------|--------|---------|
| Día                  | Mes | Año |      | Normal    | Dudoso | Retraso |
|                      |     |     |      |           |        |         |
|                      |     |     |      |           |        |         |
|                      |     |     |      |           |        |         |
|                      |     |     |      |           |        |         |

Se recomienda una re-observación anual al niño o niña de desarrollo normal hasta los 7 años (antes o más tarde 3 meses).

### Tamizaje auditivo

Los padres se aplicarán a los niños o niñas hasta los 5 años.

### Hitos del desarrollo

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sube gradas a los 17 meses de edad (aproximadamente)</p> <p>SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/></p>  | <p>Camina y habla a los 18 meses de edad (aproximadamente)</p> <p>SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/></p>  |
| <p>Diferencia el día de la noche</p> <p>SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/></p>                                                                                                            | <p>Acepta comida sólida, semisólida y variada</p> <p>SI <input type="radio"/> No <input type="radio"/></p>                                                                                                  |

 Alerta

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Sección 11

### Tamizaje

| Anemia      |      |                      |                                |                  |             |               |
|-------------|------|----------------------|--------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| Fecha       | Edad | Valor de hemoglobina | Valor de hemoglobina corregido | Resultado normal | Tratamiento | Observaciones |
| Día Mes Año |      |                      |                                | %                | %           |               |
|             |      |                      |                                |                  |             |               |
|             |      |                      |                                |                  |             |               |
|             |      |                      |                                |                  |             |               |
|             |      |                      |                                |                  |             |               |
|             |      |                      |                                |                  |             |               |
|             |      |                      |                                |                  |             |               |
|             |      |                      |                                |                  |             |               |
|             |      |                      |                                |                  |             |               |
|             |      |                      |                                |                  |             |               |

Nota: El diagnóstico de anemia en los niños y las niñas de 6 meses a 6 años se realiza con un valor de hemoglobina por debajo de 11 g/dl.

| Ajuste de altitud para medir la concentración de hemoglobina |                                    |                                         |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Altitud (metros sobre el nivel del mar)                      | Medidas de hemoglobina ajuste g/dl | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Medidas de hemoglobina ajuste g/dl |
| Menos de 1.000                                               | -0,0                               | 3.000 - 3.499                           | -1,9                               |
| 1.000 - 1.499                                                | -0,2                               | 3.500 - 3.999                           | -2,7                               |
| 1.500 - 1.999                                                | -0,5                               | 4.000 - 4.499                           | -3,5                               |
| 2.000 - 2.499                                                | -0,8                               | 4.500 - 4.999                           | -4,5                               |
| 2.500 - 2.999                                                | -1,3                               |                                         |                                    |

Para conocer el nivel de hemoglobina de referencia, restar la cantidad siguiente al valor medido.

Ej.: una niño de 2 años que vive a 1500 metros sobre el nivel del mar cuya concentración de hemoglobina es 11 g/dl tiene una concentración de hemoglobina "real" de  $11 - 0.5 = 10.5$  g/dl, o sea, si no se realizaría el ajuste con relación a altitud, equivocadamente esta niño no sería diagnosticada con anemia.

| Metros sobre el nivel del mar | Cantidad a restar a la concentración medida de Hg |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <1000                         | 0                                                 |
| 1000-1499                     | 0,2                                               |
| 1500-1999                     | 0,5                                               |
| 2000-2499                     | 0,8                                               |
| 2500-2999                     | 1,3                                               |
| 3000-3499                     | 1,9                                               |
| 3500-3999                     | 2,7                                               |
| 4000-4499                     | 3,5                                               |
| 4500-4999                     | 4,5                                               |



## Sección 12

### Registro de vacunación

Niños y niñas menores de 1 año

| Tipo de vacuna                      | Dosis   | Edad desde la vacunación | Fecha de aplicación |     |     | Edad de aplicación | Fecha | Nombre del vacunador | Estado de salud |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------|-----|-----|--------------------|-------|----------------------|-----------------|
|                                     |         |                          | Día                 | Mes | Año |                    |       |                      |                 |
| BCG (Meningitis)                    | 1 Dosis | Después de los 24 meses  |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| 13-valente (Pneumococo)             | 1 Dosis | Después de los 24 meses  |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria)                      | 1 Dosis | 2 meses                  |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
|                                     | 2 Dosis | 4 meses                  |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 1 Dosis | 2 meses                  |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
|                                     | 2 Dosis | 4 meses                  |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 3 Dosis | 6 meses                  |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
|                                     | 4 Dosis | 12 meses                 |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 1 Dosis | 2 meses                  |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
|                                     | 2 Dosis | 4 meses                  |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 3 Dosis | 6 meses                  |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
|                                     | 4 Dosis | 12 meses                 |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 1 Dosis | 2 meses                  |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
|                                     | 2 Dosis | 4 meses                  |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 3 Dosis | 6 meses                  |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
|                                     | 4 Dosis | 12 meses                 |                     |     |     |                    |       |                      |                 |

BCG (Difteria): se administrará hasta los 11 meses 29 días.

Hib (Difteria): La primera dosis es hasta los 8 meses 29 días. La segunda dosis podrá administrarse hasta los 7 meses de edad (7 meses 29 días).

\*\*\*En caso de reacción alérgica o alergia a la vacuna pertussis, no se aplicará la vacuna Hib (Difteria) en el mismo esquema que pertussis.

\*\*\*\*El intervalo entre IPV (1) y IPV (2) debe ser de 8 semanas.

### Registro de vacunación

Niños y niñas de 12 a 23 meses

| Tipo de vacuna                      | Dosis   | Edad desde la vacunación | Fecha de aplicación |     |     | Edad de aplicación | Fecha | Nombre del vacunador | Estado de salud |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------|-----|-----|--------------------|-------|----------------------|-----------------|
|                                     |         |                          | Día                 | Mes | Año |                    |       |                      |                 |
| SEP (Difteria, Tétanos, Polio)      | 1 Dosis | 12 meses                 |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 1 Dosis | 12 meses                 |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 1 Dosis | 12 meses                 |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 1 Dosis | 12 meses                 |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 1 Dosis | 12 meses                 |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 1 Dosis | 12 meses                 |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 1 Dosis | 12 meses                 |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 1 Dosis | 12 meses                 |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 1 Dosis | 12 meses                 |                     |     |     |                    |       |                      |                 |
| Hib (Difteria, Tétanos, Polio, Hib) | 1 Dosis | 12 meses                 |                     |     |     |                    |       |                      |                 |

Aplicando de forma cautelosa se verifica y una vez vacunado se registra la vacuna administrada – Captación temprana.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Sección 13

### Esquema de captación tardía de vacunación

Niños y niñas hasta los 5 años de edad

| Tipo de vacunas                     | Dosis                                      | Edad de captación esquema incompleto | Fecha de aplicación |     |     | Edad de aplicación | Lote     | Nombre del vacunador | Establecimiento de salud |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----|-----|--------------------|----------|----------------------|--------------------------|
|                                     |                                            |                                      | Día                 | Mes | Año |                    |          |                      |                          |
| DPT (difteria, tétanos y tosferina) | 1ª dosis a la captación                    | 1 a 5 años                           | 30                  | 10  | 24  | 24 m               | 504DPT02 | Uc. Luz Felix        | C.S Cotocollao           |
|                                     | 2ª dosis a los dos meses de la captación   |                                      |                     |     |     |                    |          |                      |                          |
|                                     | 3ª dosis a los seis meses de la segunda    |                                      |                     |     |     |                    |          |                      |                          |
|                                     | 4ª dosis al año de la tercera              | 2 a 5 años                           |                     |     |     |                    |          |                      |                          |
| HB Caro pediátrico (hepatitis B)    | 1ª dosis a la captación                    |                                      |                     |     |     |                    |          |                      |                          |
|                                     | 2ª dosis al mes de la captación            |                                      |                     |     |     |                    |          |                      |                          |
|                                     | 3ª dosis a los 6 meses de la segunda dosis |                                      |                     |     |     |                    |          |                      |                          |
| RPV (poliomielitis)                 | 1ª dosis                                   | 1 a 5 años                           |                     |     |     |                    |          |                      |                          |
|                                     | 2ª dosis a los 2 meses de la primera       |                                      |                     |     |     |                    |          |                      |                          |

## Sección 14

### Esquema de vacunación

Influenza estacional

| Edad óptima de vacunación  | Vacunas              | Dosis                           | Fecha de aplicación |     |     | Edad de aplicación | Lote    | Nombre del vacunador | Establecimiento de salud |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----|-----|--------------------|---------|----------------------|--------------------------|
|                            |                      |                                 | Día                 | Mes | Año |                    |         |                      |                          |
| 6 a 11 meses               | Influenza estacional | 1ª dosis                        | 30                  | 10  | 23  | 06                 | 2356GR4 | Uc. Luz Felix        | C.S Cotocollao           |
|                            |                      | 2ª dosis (al mes de la primera) |                     |     |     |                    |         |                      |                          |
| 12 a 23 meses (1 a 2 años) |                      | Una dosis                       |                     |     |     |                    |         |                      |                          |
| 24 a 35 meses (2 a 3 años) |                      | Una dosis                       |                     |     |     |                    |         |                      |                          |
| 36 a 47 meses (3 a 4 años) |                      | Una dosis                       |                     |     |     |                    |         |                      |                          |
| 48 a 59 meses (4 a 5 años) |                      | Una dosis                       |                     |     |     |                    |         |                      |                          |

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

## Sección 15 Otras vacunas de 0 a 15 años y registro de vacunación para niños o niñas desde los 5 hasta los 15 años

### Otras vacunas de 0 a 15 años

| Tipo vacunas | Dosis | Edad óptima de vacunación | Fecha de aplicación |     |     | Edad de aplicación | Lote     | Nombres del vacunador | Establecimiento de salud |
|--------------|-------|---------------------------|---------------------|-----|-----|--------------------|----------|-----------------------|--------------------------|
|              |       |                           | Día                 | Mes | Año |                    |          |                       |                          |
| Influenza    | 1     | 09 a                      | 30                  | 10  | 23  | 09 a               | 69871F05 | Lic. Luz Felix        | C.S Cotocollao           |
|              |       |                           |                     |     |     |                    |          |                       |                          |
|              |       |                           |                     |     |     |                    |          |                       |                          |
|              |       |                           |                     |     |     |                    |          |                       |                          |
|              |       |                           |                     |     |     |                    |          |                       |                          |

Observaciones: .....

### Registro de vacunación para niños o niñas desde los 5 hasta los 15 años

| Tipo vacunas | Dosis        | Edad óptima de vacunación | Fecha de aplicación |     |     | Edad de aplicación | Lote     | Nombres del vacunador | Establecimiento de salud |
|--------------|--------------|---------------------------|---------------------|-----|-----|--------------------|----------|-----------------------|--------------------------|
|              |              |                           | Día                 | Mes | Año |                    |          |                       |                          |
| bOPV         | 5.ª dosis    | 5 años                    |                     |     |     |                    |          |                       |                          |
| *DPT         | *5.ª dosis   | 5 años                    |                     |     |     |                    |          |                       |                          |
| HPV          | 1.ª dosis    | 9 años (solo niñas)       | 30                  | 10  | 23  | 09 a               | 258HPV23 | Lic. Luz Felix        | C.S Cotocollao           |
|              | 2.ª dosis**  |                           |                     |     |     |                    |          |                       |                          |
| dT adulto    | 3.º refuerzo | 15 años                   |                     |     |     |                    |          |                       |                          |

## Sección 16

### Recomendaciones para la alimentación

Del niño o la niña según la edad



#### Lactancia materna

Alimentelo únicamente con leche materna hasta los 6 meses de edad. No ofrezca otros alimentos ni líquidos, ni sólidos.

A partir de los 6 meses de edad continúe ofreciendo leche materna hasta los 2 años o más y complemente con otros alimentos.

La lactancia debe ser a libre demanda, cuando su hijo o hija lo desee, sin tiempos ni horarios. Si tiene dificultad para dar de lactar, acuda al establecimiento de salud para que le brinden asesoría a través de un profesional o en los grupos de apoyo a la lactancia materna.

## Sección 17

### Señales de peligro

En el recién nacido durante el nacimiento o la etapa neonatal



Reúndalo antes de tiempo  
(mayor probabilidad)



No respira bien



Está débil,  
no responde



Está morado  
o pálido



Está muy frío  
o muy caliente



Está riguroso, le saca  
o con ataques



No se ve bien



Leve el ombligo rojo  
o con pus



No baba


Ante cualquier  
señal de alarma  
acuda inmediatamente  
al establecimiento de  
salud más cercano  
o llame al 911.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

### Asistencia a las sesiones educativas

Durante los primeros 24 meses

**Recuerde:** Consultar en el establecimiento de salud las fechas para recibir educación e importante información sobre lactancia materna, alimentación, control de salud de su hijo o hija, vacunas y suplementación.



No olvide registrar todas las sesiones educativas.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

Ana es una niña de 3 años que vive en una comunidad rural en Ecuador. En una visita de rutina al centro de salud, se detecta que Ana presenta síntomas de xeroftalmía, que incluye sequedad en los ojos y dificultad para ver en la oscuridad. Su madre comenta que Ana ha estado comiendo una dieta limitada, principalmente compuesta de arroz y frijoles, y rara vez consume alimentos ricos en vitamina A. ¿Cuál es la medida más adecuada para mejorar el estado de salud de Ana en relación con su deficiencia de vitamina A?

Respuestas:

- a) Administrar un suplemento de vitamina A y monitorear su progreso, además de educar a la familia sobre la importancia de una dieta balanceada rica en vitamina A.
- b) Recomendar que Ana aumente su consumo de arroz y frijoles, ya que son alimentos básicos en su dieta, y evitar el uso de suplementos para no alterar su dieta habitual.
- c) Enviar a Ana a un especialista en oftalmología para que reciba tratamiento específico para sus ojos sin considerar el uso de suplementos de vitamina A.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

Ana es una niña de 3 años que vive en una comunidad rural en Ecuador. En una visita de rutina al centro de salud, se detecta que Ana presenta síntomas de xeroftalmía, que incluye sequedad en los ojos y dificultad para ver en la oscuridad. Su madre comenta que Ana ha estado comiendo una dieta limitada, principalmente compuesta de arroz y frijoles, y rara vez consume alimentos ricos en vitamina A. ¿Cuál es la medida más adecuada para mejorar el estado de salud de Ana en relación con su deficiencia de vitamina A?

Respuestas:

- a) Administrar un suplemento de vitamina A y monitorear su progreso, además de educar a la familia sobre la importancia de una dieta balanceada rica en vitamina A.**
- b) Recomendar que Ana aumente su consumo de arroz y frijoles, ya que son alimentos básicos en su dieta, y evitar el uso de suplementos para no alterar su dieta habitual.
- c) Enviar a Ana a un especialista en oftalmología para que reciba tratamiento específico para sus ojos sin considerar el uso de suplementos de vitamina A.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

La **administración de un suplemento de vitamina A** es crucial en este caso para abordar la deficiencia inmediata de la vitamina, que está causando síntomas de xeroftalmía en Ana. La xeroftalmía es una manifestación clínica de deficiencia severa de vitamina A y puede llevar a ceguera si no se trata adecuadamente.

Aunque el arroz y los frijoles son alimentos nutritivos, no son ricos en vitamina A. Dependar únicamente de estos alimentos no resolverá la deficiencia de vitamina A de Ana. Además, dado que Ana ya muestra síntomas clínicos de deficiencia.

Si bien un especialista en oftalmología puede tratar los síntomas oculares específicos, no abordar la causa subyacente de la deficiencia de vitamina A dejaría a Ana en riesgo de sufrir más problemas de salud relacionados con la deficiencia de esta vitamina. La xeroftalmía es un signo de deficiencia nutricional

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

¿Cuántos controles debe asistir la mujer gestante durante su gestación?

Respuestas:

- a) 3 controles mínimos
- b) 4 controles mínimos
- c) 5 controles mínimos



# Manejo de la Libreta Integral de Salud

¿Cuántos controles debe asistir la mujer gestante durante su gestación?

Respuestas:

- a) 3 controles mínimos
- b) 4 controles mínimos
- c) 5 controles mínimos**

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

Una señora acude al centro de salud con su hijo de 10 m 15 días de edad, por control de niño sano, sus signos vitales son: temperatura 37.3 °C; frecuencia cardíaca: 120/min; presión arterial; 90/62 mmHg; frecuencia respiratoria 40/min, al observar el carnet de vacunación, verifica que tiene administrada las siguientes vacunas: pentavalente 3 dosis, Polio 0 dosis, Neumococo 3 dosis y Rotavirus 2 dosis. ¿Qué acción de enfermería aplicaría en este caso?

## Respuestas:

- Administrar la 1° dosis de fIPV.
- Administrar la dosis completa de 0,5ml de fIPV IM.
- Administrar la 1° dosis de bOPV.
- Administrar la 1° dosis de bOPV y la 2° a las 2 semanas.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

Una señora acude al centro de salud con su hijo de 10 m 15 días de edad, por control de niño sano, sus signos vitales son: temperatura 37.3 °C; frecuencia cardíaca: 120/min; presión arterial; 90/62 mmHg; frecuencia respiratoria 40/min, al observar el carnet de vacunación, verifica que tiene administrada las siguientes vacunas: pentavalente 3 dosis, Polio 0 dosis, Neumococo 3 dosis y Rotavirus 2 dosis. ¿Qué acción de enfermería aplicaría en este caso?

## Respuestas:

### - Administrar la 1º dosis de fIPV.

- Administrar la dosis completa de 0,5ml de fIPV IM.
- Administrar la 1º dosis de bOPV.
- Administrar la 1º dosis de bOPV y la 2ºa las 2 semanas.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

Mujer lleva a la unidad de salud por control de niño sano a su hijo de 11 meses, luego de la revisión médica, el profesional encuentra que el niño está bajo de peso para la edad y solo ha recibido las vacunas de los 2 meses, por lo tanto, remite a la madre al vacunatorio. El profesional de enfermería revisa el carné y corrobora lo reportado por el médico. ¿Qué intervención de enfermería corresponde?

## Respuestas:

- Aplicar 2da. dosis de: fIPV, neumococo y pentavalente.
- Aplicar 2da. dosis de: neumococo y pentavalente.
- Aplicar 2da. dosis de: Rotavirus, fIPV, neumococo y pentavalente.
- Aplicar 2da. dosis de: bOPV, neumococo y pentavalente.

# Manejo de la Libreta Integral de Salud

Mujer lleva a la unidad de salud por control de niño sano a su hijo de 11 meses, luego de la revisión médica, el profesional encuentra que el niño está bajo de peso para la edad y solo ha recibido las vacunas de los 2 meses, por lo tanto, remite a la madre al vacunatorio. El profesional de enfermería revisa el carné y corrobora lo reportado por el médico. ¿Qué intervención de enfermería corresponde?

## Respuestas:

- **Aplicar 2da. dosis de: fIPV, neumococo y pentavalente.**
- Aplicar 2da. dosis de: neumococo y pentavalente.
- Aplicar 2da. dosis de: Rotavirus, fIPV, neumococo y pentavalente.
- Aplicar 2da. dosis de: bOPV, neumococo y pentavalente.

## **Farmaconocividad y teratogenicidad en el embarazo**



# Farmaconocividad y teratogenicidad en el embarazo

Un teratógeno es cualquier factor medioambiental que pueda **producir anomalías permanentes en la estructura o función del embrión o el feto, restricción de su crecimiento o su muerte.** Estos factores incluyen medicamentos, drogas, sustancias químicas y las condiciones o enfermedades maternas, incluyendo las infecciones

El riesgo cero no existe. Siempre hay un riesgo basal o poblacional de que el embrión/feto presente algún defecto congénito



# Farmaconocividad y teratogenicidad en el embarazo

## Consideraciones Generales

No existe una barrera fisiológica protectora entre el medio materno y el fetal. La mayoría de los medicamentos atraviesan la placenta.

El momento gestacional en el que se produce la exposición al fármaco condiciona el patrón y tipo de malformación. La valoración beneficio-riesgo debe extenderse a todo el embarazo y no sólo al primer trimestre.

La absorción y acción de un fármaco puede ser diferente en función de la vía de administración: la sistémica puede aumentar el riesgo de teratogenia, mientras que la tópica podría no hacerlo.

- Utilizar la menor dosis eficaz y durante el menor tiempo posible.

# Farmaconocividad y teratogenicidad en el embarazo

## PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS (PPE)

Conjunto de intervenciones destinadas a minimizar el riesgo de embarazo durante el tratamiento con un fármaco con efectos teratogénicos conocidos o potenciales.

Garantizar que las mujeres no estén embarazadas cuando inicien la terapia y no queden embarazadas durante el curso y en algunos casos también, poco después de suspender el tratamiento.

Combina el uso de herramientas educativas con intervenciones para controlar el acceso al medicamento

## Fármacos con efectos teratogénicos

| Fármaco                                                                      | Efectos teratogénicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Consideraciones específicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retinoides orales (acitretina, alitretinoína e isotretinoína) <sup>8,9</sup> | <p>Anomalías del sistema nervioso central (hidrocefalia, malformación/anomalia cerebelosa, microcefalia), dismorfia facial, hendidura palatina, anomalías del oído externo (ausencia de oído externo, canales auditivos externos pequeños o inexistentes), anomalías oculares (microftalmia), anomalías cardiovasculares (malformaciones conotruncuales, tales como tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos y defectos del tabique), alteraciones del timo y de las glándulas paratiroides.</p> <p>Aumento del número de abortos espontáneos.</p> <p>Aunque el uso de retinoides tópicos no se ha asociado con la aparición de malformaciones fetales, no se recomienda su uso durante el embarazo ni en mujeres que lo estén planificando.</p>                                 | <p>Alitretinoína e isotretinoína: realizar controles para comprobar la ausencia de embarazo hasta un mes después de la finalización del tratamiento.</p> <p>Acitretina: comprobar la ausencia de embarazo cada 1-3 meses durante los tres años posteriores a la finalización del tratamiento.</p> <p>Las mujeres en edad reproductiva no deben consumir alcohol durante el tratamiento con acitretina ni durante los dos meses posteriores a haber finalizado el tratamiento ya que puede formarse etretinato, que es altamente teratogénico.</p> |
| Valproato <sup>10</sup>                                                      | <p>Malformaciones congénitas en aproximadamente el 10% de los casos: defectos del tubo neural, dismorfia facial, paladar hendido y labio leporino, craneosinostosis, defectos cardíacos, renales y urogenitales, defectos en las extremidades (incluyendo aplasia bilateral del radio) y anomalías múltiples con afectación de varios órganos y sistemas.</p> <p>Trastornos en el desarrollo neurocognitivo hasta en el 40% de los casos: trastorno en el desarrollo temprano, como retraso al caminar y hablar, problemas de memoria, dificultad en el habla y el lenguaje y menor cociente intelectual.</p> <p>Puede existir un incremento del riesgo de presentar autismo infantil, de otros trastornos del espectro autista y de trastorno por déficit de atención e hiperactividad.</p> | <p>Necesidad de una revisión regular (al menos anualmente) del tratamiento por un especialista con experiencia en el manejo de la epilepsia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Farmaconocividad y teratogenicidad en el embarazo

## Fármacos con efectos teratogénicos

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Talidomida (UH),<br/>Lenalidomida (UH),<br/>Pomalidomida (UH)<sup>a</sup></p> | <p>Talidomida: frecuencia de efectos adversos: 30%. Ectromelia (amelia, focomelia, hemimelia) de las extremidades superiores y/o inferiores, microtia con anomalías del oído externo (anotia o microtia), lesiones del oído medio e interno (menos frecuentes), lesiones oculares (anoftalmia, microftalmia), enfermedad cardíaca congénita o anomalías renales.</p> <p>La lenalidomida y la pomalidomida están relacionadas estructuralmente con la talidomida, por lo que es esperable que tengan efectos teratogénicos similares.</p> | <p>No utilizar anticonceptivos orales combinados por el mayor riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes con mieloma múltiple.</p> <p>Realizar controles para comprobar la ausencia de embarazo cuatro semanas antes de iniciar el tratamiento y hasta un mes después de la finalización del tratamiento.</p> <p>Varones en tratamiento: utilizar preservativo durante todo el tratamiento y hasta 7 días después de su finalización, incluyendo los periodos con interrupción de dosis (también los vasectomizados).</p> |
| <p>Vismodegib (DH.<br/>Dispensación ambulatoria hospitalaria)<sup>a</sup></p>    | <p>Teratígeno en animales. Puede provocar graves malformaciones, incluyendo anomalías craneofaciales, defectos en la línea media y en las extremidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Evitar el embarazo hasta 24 meses después de la finalización el tratamiento.</p> <p>Varones en tratamiento: utilizar preservativo (preferiblemente con espermicida) durante todo el tratamiento y los 2 meses posteriores a la administración de la última dosis (también los vasectomizados).</p>                                                                                                                                                                                                                        |

UH: Uso Hospitalario; DH: Diagnóstico Hospitalario

## Fármacos contraindicados en el primer trimestre o durante todo el embarazo

Sólo se deben utilizar en mujeres en edad reproductiva una vez descartado el embarazo y tras constatar que se están utilizando métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento

| Fármaco                                                         | Efectos adversos                                                                                                                                                                                                                                                           | Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Derivados cumarínicos<br>(acenocumarol, warfarina) <sup>a</sup> | Se ha descrito hipoplasia nasal grave, condrodisplasia punctata, atrofia óptica, microcefalia y retraso mental y del crecimiento.                                                                                                                                          | Alternativa: heparina, especialmente durante el primer trimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Metotrexato <sup>a,13</sup>                                     | Restricción del crecimiento intrauterino, anomalías craneofaciales, cardiovasculares, del sistema nervioso central y relacionadas con las extremidades. También se ha descrito ocasionalmente retraso mental.<br><br>Aumento de abortos espontáneos (42,5 % de los casos). | En mujeres en edad reproductiva: utilizar medidas anticonceptivas eficaces hasta 6 meses después de la finalización del tratamiento.<br><br>En varones en tratamiento: utilizar medidas anticonceptivas durante el tratamiento y hasta 6 meses después de la finalización del mismo. Se recomienda que sus parejas femeninas también tomen medidas anticonceptivas eficaces durante el mismo periodo. |

## Fármacos contraindicados en el primer trimestre o durante todo el embarazo

Sólo se deben utilizar en mujeres en edad reproductiva una vez descartado el embarazo y tras constatar que se están utilizando métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento

| Fármaco                     | Efectos adversos                                                                                                                                                                   | Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leflunomida <sup>9,13</sup> | <p>Teratógeno en animales.</p> <p>Se sospecha que el metabolito activo de la leflunomida, el A771726, provoca graves defectos neonatales si se administra durante el embarazo.</p> | <p>En mujeres en edad reproductiva: utilizar medidas anticonceptivas eficaces hasta 2 años después de la finalización del tratamiento para asegurar que los niveles del metabolito A771726 sean inferiores a 0,02 mg/l o acortar ese periodo realizando un procedimiento de lavado con colestiramina o carbón activado.</p> <p>En varones en tratamiento: utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento. En caso de desear un embarazo, realizar el mismo procedimiento de lavado que en mujeres para asegurar que los niveles del metabolito A771726 son inferiores a 0,02 mg/l. Se recomienda que sus parejas femeninas también tomen medidas anticonceptivas eficaces durante el mismo periodo.</p> |

## Fármacos contraindicados en el primer trimestre o durante todo el embarazo

| Fármaco                                                      | Efectos adversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Micofenolato de mofetilo y micofenolato sódico <sup>14</sup> | <p>Malformaciones congénitas en alrededor del 25% de los casos: faciales (p. ej. labio leporino, paladar hendido, micrognatia, hipertelorismo), oculares (p. ej. coloboma), óticas (p. ej. atresia del conducto auditivo externo), traqueo-esofágicas (p. ej. atresia de esófago), digitales (p. ej. polidactilia, sindactilia), renales, cardíacas (p. ej. defectos de los septos auriculares y ventriculares) y del sistema nervioso (p. ej. espina bífida).</p> <p>Abortos espontáneos en alrededor del 50% de los casos.</p> | <p>En mujeres en edad reproductiva: utilizar medidas anticonceptivas eficaces hasta 6 semanas después de la finalización del tratamiento.</p> <p>En varones en tratamiento: utilizar preservativo durante y hasta 90 días después de la finalización del tratamiento (incluidos aquellos sometidos a una vasectomía). Se recomienda que sus parejas femeninas también tomen medidas anticonceptivas eficaces durante el mismo periodo.</p> |
| Ciclofosfamida oral <sup>8,15</sup>                          | <p>Uso en el primer trimestre: retraso en el crecimiento fetal y efectos fetotóxicos (leucopenia, anemia, pancitopenia, hipoplasia de médula ósea grave y gastroenteritis).</p> <p>Defectos en el esqueleto y malformaciones de las extremidades y los ojos.</p> <p>Abortos espontáneos.</p> <p>Su uso durante el segundo y tercer trimestre de embarazo puede estar asociado a pancitopenia y retraso en el crecimiento fetal.</p>                                                                                              | <p>En mujeres en edad reproductiva: utilizar medidas anticonceptivas eficaces hasta 12 meses después de la finalización del tratamiento.</p> <p>En varones en tratamiento: utilizar medidas anticonceptivas durante el tratamiento y hasta 6 meses después de la finalización del mismo.</p>                                                                                                                                               |

# Farmaconocividad y teratogenicidad en el embarazo

## Fármacos contraindicados en el primer trimestre o durante todo el embarazo

| Fármaco                                                                           | Efectos adversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Recomendaciones                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Misoprostol (comercializado en monoterapia y en asociación con AINE) <sup>8</sup> | Síndrome de Moebius (parálisis facial congénita que conduce a hipomimia, dificultades de succión y deglución y movimientos oculares, con o sin malformaciones en las extremidades); síndrome de bridas amnióticas (deformidades/amputaciones de las extremidades, especialmente pie zambo, acheiria, oligodactilia, paladar hendido, entre otros) y anomalías del sistema nervioso central (anomalías cerebrales y craneales como anencefalia, hidrocefalia, hipoplasia cerebelosa, defectos del tubo neural).<br><br>Riesgo de aborto espontáneo. |                                                             |
| Tiocolchicósido (comercializado en asociación con paracetamol) <sup>8,16</sup>    | Riesgo de sufrir aborto, parto prematuro, muerte del neonato o desarrollo de malformaciones congénitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| Ondansetrón <sup>8R,17</sup>                                                      | Uso en el primer trimestre: existe un ligero aumento de riesgo de defectos de cierre orofaciales (3 casos adicionales de hendiduras bucales por 10.000 mujeres tratadas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No debe utilizarse durante el primer trimestre de embarazo. |

### Fármacos contraindicados en el primer trimestre o durante todo el embarazo

**El litio, el carbimazol y su metabolito activo tiamazol (metimazol)**, y algunos antiepilépticos como la carbamazepina, el fenobarbital y el topiramato (contraindicado en embarazo para el tratamiento de la migraña) son fármacos que, debido a las enfermedades que tratan y en ausencia de alternativas terapéuticas, podrían ser utilizados durante el embarazo tras una estricta valoración beneficio-riesgo individualizada.

En estos casos, además de utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento, se aconseja seguir las recomendaciones generales: usar estos medicamentos en monoterapia y a la menor dosis efectiva, informar a la paciente de los **riesgos para el feto** y realizar una estrecha vigilancia materna, fetal y neonatal.

## Fármacos con efectos fetotóxicos

Desde el inicio del tercer mes de embarazo comienza la vida fetal. Ciertos medicamentos están específicamente contraindicados durante este periodo debido a los efectos fetales o neonatales severos que provocan y a la existencia de alternativas terapéuticas.

| Fármaco                                                    | Efectos adversos                                                                                                                                                                                                                                                                                | Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AINES (incluidos los Coxibs) sistémicos <sup>8,13,15</sup> | <p>Tercer trimestre: cierre prematuro del ductus arterioso, hipertensión pulmonar permanente y disfunción renal.</p> <p>Primer y segundo trimestre: aumento del riesgo de aborto espontáneo.</p> <p>Casos de malformaciones cardíacas y gastroquiasis.</p>                                      | <p>Contraindicados en el tercer trimestre. No se recomienda su uso en el primer y segundo trimestre.</p> <p>En ausencia de alternativas: utilizar la menor dosis durante el menor tiempo posible en el primer y segundo trimestre de embarazo.</p> |
| IECA y ARAII <sup>6,8,21</sup>                             | <p>Segundo y tercer trimestre: descenso de la función renal, oligohidramnios, retraso en la osificación del cráneo.</p> <p>En recién nacidos insuficiencia renal, hipotensión e hiperpotasemia.</p> <p>Riesgo potencial de malformaciones cardíacas si se usan durante el primer trimestre.</p> | <p>Contraindicados en el segundo y tercer trimestre. No se recomienda su uso en el primer trimestre.</p> <p>En caso de embarazo, iniciar un tratamiento con labetalol o metildopa, o alternativamente, nifedipino.</p>                             |

## Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina

Benazepril (Lotensin).  
Captopril.  
Enalapril (Vasotec).  
Fosinopril.  
Lisinopril (Zestril).  
Moexipril.  
Perindopril.  
Quinapril.  
Ramipril (Altace).  
Trandolapril.

## Fármacos con efectos fetotóxicos

Desde el inicio del tercer mes de embarazo comienza la vida fetal. Ciertos medicamentos están específicamente contraindicados durante este periodo debido a los efectos fetales o neonatales severos que provocan y a la existencia de alternativas terapéuticas.

| Fármaco                                                  | Efectos adversos                                                                                                                                                                                                                                                                                | Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AINE (incluidos los Coxib) sistémicos <sup>8,13,15</sup> | <p>Tercer trimestre: cierre prematuro del ductus arterioso, hipertensión pulmonar permanente y disfunción renal.</p> <p>Primer y segundo trimestre: aumento del riesgo de aborto espontáneo.</p> <p>Casos de malformaciones cardíacas y gastroquisis.</p>                                       | <p>Contraindicados en el tercer trimestre. No se recomienda su uso en el primer y segundo trimestre.</p> <p>En ausencia de alternativas: utilizar la menor dosis durante el menor tiempo posible en el primer y segundo trimestre de embarazo.</p> |
| IECA y ARAII <sup>6,8,21</sup>                           | <p>Segundo y tercer trimestre: descenso de la función renal, oligohidramnios, retraso en la osificación del cráneo.</p> <p>En recién nacidos insuficiencia renal, hipotensión e hiperpotasemia.</p> <p>Riesgo potencial de malformaciones cardíacas si se usan durante el primer trimestre.</p> | <p>Contraindicados en el segundo y tercer trimestre. No se recomienda su uso en el primer trimestre.</p> <p>En caso de embarazo, iniciar un tratamiento con labetalol o metildopa, o alternativamente, nifedipino.</p>                             |

## IRAI antagonistas de los receptores de la angiotensina 2

Azilsartán (Edarbi).  
Candesartán (Atacand).  
Irbesartán (Avapro).  
Losartán (Cozaar).  
Olmesartán (Benicar).  
Telmisartán (Micardis).  
Valsartán (Diovan).

## Fármacos con efectos fetotóxicos

Entre los antiepilépticos usados en monoterapia, el **valproato se asocia con tasas muy altas** de malformaciones, **la fenitoína y el fenobarbital con tasas altas** y la **carbamazepina, el topiramato y la zonisamida con tasas moderadas**.

**La lamotrigina, el levetiracetam y la oxcarbazepina tienen las tasas más bajas**, similares a las de la población general.



María, una mujer de 28 años, está en su primer trimestre de embarazo y acude a su consulta prenatal. Durante la entrevista, menciona que ha estado tomando un medicamento para la acné severo recetado por su dermatólogo antes de saber que estaba embarazada. Al revisar el historial médico y los medicamentos actuales, el médico se da cuenta de que el medicamento es **isotretinoína**. ¿Cuál es la medida más adecuada para abordar la situación de María en relación con la exposición a un teratógeno durante el embarazo?

### Respuestas:

- Interrumpir inmediatamente el uso de isotretinoína y remitir a María a un especialista en medicina materno-fetal para una evaluación detallada y monitoreo del desarrollo fetal.
- Continuar con el uso de isotretinoína ya que el daño potencial ya está hecho y centrarse en otras áreas del cuidado prenatal.
- Recomendar a María que observe cualquier síntoma en su embarazo y evite preocupaciones innecesarias, ya que no todos los bebés expuestos a teratógenos desarrollan problemas.

María, una mujer de 28 años, está en su primer trimestre de embarazo y acude a su consulta prenatal. Durante la entrevista, menciona que ha estado tomando un medicamento para la acné severo recetado por su dermatólogo antes de saber que estaba embarazada. Al revisar el historial médico y los medicamentos actuales, el médico se da cuenta de que el medicamento es **isotretinoína**. ¿Cuál es la medida más adecuada para abordar la situación de María en relación con la exposición a un teratógeno durante el embarazo?

### Respuestas:

- Interrumpir inmediatamente el uso de isotretinoína y remitir a María a un especialista en medicina materno-fetal para una evaluación detallada y monitoreo del desarrollo fetal.**
- Continuar con el uso de isotretinoína ya que el daño potencial ya está hecho y centrarse en otras áreas del cuidado prenatal.
- Recomendar a María que observe cualquier síntoma en su embarazo y evite preocupaciones innecesarias, ya que no todos los bebés expuestos a teratógenos desarrollan problemas.

La isotretinoína es un conocido teratógeno que puede causar graves malformaciones congénitas si se toma durante el embarazo. La medida más adecuada es interrumpir inmediatamente su uso para evitar cualquier exposición adicional. Remitir a María a un especialista en medicina materno-fetal es crucial para realizar una evaluación detallada del desarrollo fetal y proporcionar el seguimiento necesario.

Aunque no todos los bebés expuestos a teratógenos desarrollan problemas, la isotretinoína tiene un alto riesgo de causar malformaciones congénitas. Simplemente observar los síntomas sin una evaluación especializada no es suficiente.



¿Cuáles son algunas de las razones por las que ciertos medicamentos están contraindicados durante el embarazo?

### Respuestas:

- a) Pueden causar alergias leves.
- b) Pueden atravesar la placenta y afectar el desarrollo del feto.
- c) Pueden causar náuseas y vómitos en la madre.



¿Cuáles son algunas de las razones por las que ciertos medicamentos están contraindicados durante el embarazo?

### Respuestas:

a) Pueden causar alergias leves.

**b) Pueden atravesar la placenta y afectar el desarrollo del feto.**

c) Pueden causar náuseas y vómitos en la madre.



Los medicamentos pueden atravesar la placenta y afectar el desarrollo del feto, causando malformaciones congénitas, retraso en el crecimiento, o problemas en el desarrollo de órganos.

Aunque algunos medicamentos pueden causar alergias, esto no es la razón principal por la que se contraindican durante el embarazo. Las alergias leves no suelen tener un impacto significativo en el desarrollo fetal.

Náuseas y vómitos son efectos secundarios comunes de muchos medicamentos, pero no son la razón principal por la que un medicamento se contraindicaría durante el embarazo, ya que estos efectos no afectan directamente al feto.

María, de 28 años, está en su segundo trimestre de embarazo. Ha acudido a su médico de cabecera por dolor de cabeza persistente. El médico está considerando prescribirle un medicamento para aliviar el dolor, pero antes de hacerlo, debe tener en cuenta las posibles contraindicaciones durante el embarazo. ¿Cuál de las siguientes razones sería la más importante para que el médico evite prescribir ciertos medicamentos a María durante su embarazo?

### Respuestas:

- a) Pueden alterar el sueño de la madre, afectando su bienestar general.
- b) Pueden pasar a través de la leche materna y causar problemas en el bebé.
- c) Pueden causar malformaciones congénitas o problemas en el desarrollo fetal.



## Farmaconocividad y teratogenicidad en el embarazo



María, de 28 años, está en su segundo trimestre de embarazo. Ha acudido a su médico de cabecera por dolor de cabeza persistente. El médico está considerando prescribirle un medicamento para aliviar el dolor, pero antes de hacerlo, debe tener en cuenta las posibles contraindicaciones durante el embarazo. ¿Cuál de las siguientes razones sería la más importante para que el médico evite prescribir ciertos medicamentos a María durante su embarazo?

### Respuestas:

- a) Pueden alterar el sueño de la madre, afectando su bienestar general.
- b) Pueden pasar a través de la leche materna y causar problemas en el bebé.
- c) Pueden causar malformaciones congénitas o problemas en el desarrollo fetal.**

Los medicamentos que pueden causar malformaciones congénitas o problemas en el desarrollo fetal son especialmente preocupantes durante el embarazo, ya que el feto es muy sensible a las sustancias teratogénicas.

Aunque alterar el sueño de la madre puede afectar su bienestar, esto no es una razón de peso suficiente para contraindicar un medicamento durante el embarazo.

La transferencia de medicamentos a través de la leche materna es una preocupación válida, pero esto es más relevante durante la lactancia, no durante el embarazo.

Ana, de 30 años, está en su segundo trimestre de embarazo y ha sido diagnosticada con hipertensión severa. Su médico está considerando varias opciones de tratamiento y está pensando en prescribirle enalapril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA). ¿Cuál es principal efecto feto toxico a considerar en el embarazo de Ana?

### Respuestas

- a) Puede causar fatiga extrema en la madre.
- b) Descenso de la función renal, oligohidramnios
- c) Efectos limitados, sin mal formación

Ana, de 30 años, está en su segundo trimestre de embarazo y ha sido diagnosticada con hipertensión severa. Su médico está considerando varias opciones de tratamiento y está pensando en prescribirle enalapril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA). ¿Cuál es principal efecto feto toxico a considerar en el embarazo de Ana?

### Respuestas

a) Puede causar fatiga extrema en la madre.

**b) Descenso de la función renal, oligohidramnios**

c) Efectos limitados, sin mal formación

El inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) presenta efectos con mas riesgo durante el segundo y tercer trimestre de embarazo con descenso de la función renal, oligohidramnios, retraso en la osificación del cráneo.

Las mal formaciones son potenciales entre ella se encuentra malformaciones cardiacas si se usan durante el primer trimestre